

Vachotte

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe : /

Ordre : russulales

Famille :

russulaceae

Nom latin :

Lactarius volemus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Tricholome spinuleux

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Basidiomycetes

Ordre : agaricales

Famille :

tricholomataceae

Nom latin :

Porpoloma

spinulosum

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: Mr Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Tricholome doré

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

Milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Basidiomycetes

Ordre : agaricales

Famille :

tricholomataceae

Nom latin :

Tricholoma auratum

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Russule verdoyante, Palomet

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

Milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Ordre : russulales

Famille :

russulaceae

Nom latin :

Russula virescens

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Russule très gracile

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /
Ordre : russulales
Famille :
russulaceae
Nom latin :
Russula gracillima

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Russule presque rouge

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : russulales

Famille :
russulaceae

Nom latin :
Russula subrubens

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

 Source: SMNF – Didier Huart

Russule modeste

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe : /

Ordre : russulales

Famille :

russulaceae

Nom latin :

Russula pumila

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Russule dorée

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

Milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Ordre : russulales

Famille :

russulaceae

Nom latin :

Russula aurea

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Russule brun violacé

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe : /

Ordre : russulales

Famille :
russulaceae

Nom latin :

Russula

bunneoviolacea

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Polypore en ombelle

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

Milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /
Ordre :
polyporales
Famille :
polyporaceae
Nom latin :
Dendropolyporus
umbellatus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Pleurote des chaumes

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe : /

Ordre :

tricholomatales

Famille :

pleurotaceae

Nom latin :

Hohenbuehlia

culmicola

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Phylloporo

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe : /

Ordre : boletales

Famille :

boletaceae

Nom latin :

Phylloporus

pelletieri

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Lactaire lilacin

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

Milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Ordre : russulales

Famille :

russulaceae

Nom latin :

Lactarius
lilacinus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Lactaire jaune à lait violet

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe : /

Ordre : russulales

Famille :
russulaceae

Nom latin :
Lactarius flavidus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Lactaire fausse omphale

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

Milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /
Ordre : russulales
Famille :
russulaceae
Nom latin :
Lactarius
omphaliformis

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Inocybe des saules

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts et zones humides

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Basidiomycetes

Ordre : agaricales

Famille :

inocybaceae

Nom latin :

Inocybe salicis

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Hygrophore des bois

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

Milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Ordre :

Tricholomatales

Famille :

hygrophoraceae

Nom latin :

Hygrophorus nemoreus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Entolome livide

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Ordre : entolomatales

Famille :
entolomataceae
Nom latin :
Entoloma lividum

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Cortinaire violet

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe :
Basidiomycetes

Ordre : agaricales
Famille :
cortinariaceae
Nom latin :
Cortinarius
violaceus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Cortinaire roux olivacé

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Basidiomycetes

Ordre : agaricales

Famille :

cortinariaceae

Nom latin :

Cortinarius rufoolivaceus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Cortinaire à armille écaileuse

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

Milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Basidiomycetes

Ordre : agaricales

Famille :

cortinariaceae

Nom latin :

Cortinarius

pholideus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Clavaire violette

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe : /

Ordre : clavariales
Famille : clavariaceae
Nom latin : *Clavaria zollingeri*

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Chanterelle jaune et violette

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

Milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre :
cantharellales
Famille :
cantharellaceae
Nom latin :
Cantharellus
ianthinoxanthus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Cèpe tête de nègre

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe : /

Ordre : boletales

Famille :

boletaceae

Nom latin :

Boletus aereus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Bolet satan

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe : /

Ordre : boletales

Famille :

boletaceae

Nom latin :

Boletus satanas

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bolet pomme de pin

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

Milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Ordre : boletales

Famille :

boletaceae

Nom latin :

Strobilomyces strobilaceus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bolet faux-royal

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Ordre : boletales

Famille :

boletaceae

Nom latin :

Boletus

pseudoregius

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bolet de l'aulne

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : boletales

Famille :
paxillaceae
Nom latin :
Gyrodon lividus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bolet châtaigne

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe : /

Ordre : boletales

Famille :

gyroporaceae

Nom latin :

Gyroporus
castaneus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bolet appendiculé

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

Milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Ordre : boletales

Famille :

boletaceae

Nom latin :

Boletus appendiculatus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bolet à pied jaune

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Ordre : boletales

Famille :

boletaceae

Nom latin :

Leccinum

crocipodium

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Amanite étranglée

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : Amanitales

Famille :
amanitaceae

Nom latin :
Amanita ceciliae

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Amanite épineuse

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe : /

Ordre : Amanitales

Famille :

amanitaceae

Nom latin :

Amanita echinocephala

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Hygrophore de Coleman

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Fonge

milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
basidiomycetes

Classe : /

Ordre :
ticholomalates

Famille :
hygrophoraceae

Nom latin :

*Cuphophyllum
colemannianus*

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Hygrophore en capuchon

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Fonge

Milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
basidiomycetes

Classe : /

Ordre :
ticholomalates

Famille :
hygrophoraceae

Nom latin :
Hygrocybe calyptiformis

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Hygophore baveux

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Fonge

Milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
basidiomycetes

Classe : /

Ordre :
ticholomalates

Famille :
hygrophoraceae

Nom latin :
Hygrocybe unguinosa

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018