

Piérieide de la moutarde

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Rhopalocères

milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :

arthropodia

Classe : insecta

Ordre :

lepidoptera

Famille : pieridae

Nom latin :

Leptidea sinapis

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Courtilière commune

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Orthoptères

milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :

arthropodia

Classe : insecta

Ordre : orthoptera

Famille :

gryllotapidae

Nom latin :

Gryllotalpa

gryllotalpa

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Sympetrum vulgaire

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Odonates

Milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :

arthropodia

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :

libellullidae

Nom latin :

Sympetrum vulgatum

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Orthetrum brunneum

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Odonates

milieu : milieux anthropisés

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :

arthropodia

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :

libellullidae

Nom latin :

Orthetrum brunneum

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Libellule fauve

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Odonates

milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :

arthropodia

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :
libellulidae
Nom latin :
Libellula fulva

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Leuccorhine à gros thorax

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Odonates

milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :

arthropodia

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :

libellullidae

Nom latin :

Leuccorhinia

pectoralis

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Corduligastre annelé

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Odonates

milieu : rivières

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :

arthropodia

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :

cordulegastridae

Nom latin :

Cordulegaster

boltonii

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Calopteryx virge

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Odonates

milieu : rivières

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :

arthropodia

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :

calopterygidae

Nom latin :

Calopteryx virgo

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Anax parthenope

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Odonates

Milieu : Zones humides

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :

arthropodia

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :

aeshnidae

Nom latin : *Anax*

parthenope

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Aeschna affine

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Odonates

milieu : Zones humides

Taxonomi e

Règne : Animalia

Embranchement :

arthropodia

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :

aeshnidae

Nom latin :

Aeschne affinis

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Planorbe naine

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Mollusques

milieu : Zones humides

Taxonomi e

Règne : Animalia

Embranchement :

Mollusca

Classe : gastropoda

Ordre : hygrophila

Famille :

planorbidae

Nom latin : *Anisus*

vorticulus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Mulette épaisse

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Mollusques

milieu : Rivières

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :

Mollusca

Classe : bivalvi

Ordre : unionoida

Famille :

unionidae

Nom latin : *Unio*

crassus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Vachotte

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe : /

Ordre : russulales

Famille :

russulaceae

Nom latin :

Lactarius volemus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Tricholome spinuleux

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Basidiomycetes

Ordre : agaricales

Famille :

tricholomataceae

Nom latin :

Porpoloma

spinulosum

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: Mr Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Tricholome doré

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Basidiomycetes

Ordre : agaricales

Famille :

tricholomataceae

Nom latin :

Tricholoma auratum

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Russule verdoyante, Palomet

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe : /

Ordre : russulales

Famille :

russulaceae

Nom latin :

Russula virescens

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Russule très gracile

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /
Ordre : russulales
Famille :
russulaceae
Nom latin :
Russula gracillima

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Russule presque rouge

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /
Ordre : russulales
Famille :
russulaceae
Nom latin :
Russula subrubens

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Russule modeste

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe : /

Ordre : russulales

Famille :

russulaceae

Nom latin :

Russula pumila

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Russule dorée

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

Milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Ordre : russulales

Famille :

russulaceae

Nom latin :

Russula aurea

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Russule brun violacé

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe : /

Ordre : russulales

Famille :

russulaceae

Nom latin :

Russula

bunneoviolacea

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Polypore en ombelle

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

Milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /
Ordre :
polyporales
Famille :
polyporaceae
Nom latin :
Dendropolyporus
umbellatus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Pleurote des chaumes

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe : /

Ordre :

tricholomatales

Famille :

pleurotaceae

Nom latin :

Hohenbuehlia

culmicola

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Phylloporo

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe : /

Ordre : boletales

Famille :

boletaceae

Nom latin :

*Phylloporus
pelletieri*

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Lactaire lilacin

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe : /

Ordre : russulales

Famille :

russulaceae

Nom latin :

Lactarius

lilacinus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Lactaire jaune à lait violet

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe : /

Ordre : russulales

Famille :

russulaceae

Nom latin :
Lactarius flavidus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Lactaire fausse omphale

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /
Ordre : russulales
Famille :
russulaceae
Nom latin :
Lactarius
omphaliformis

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Inocybe des saules

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts et zones humides

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Basidiomycetes

Ordre : agaricales

Famille :

inocybaceae

Nom latin :

Inocybe salicis

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Hygrophore des bois

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

Milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe : /

Ordre :

Tricholomatales

Famille :

hygrophoraceae

Nom latin :

Hygrophorus nemoreus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Entolome livide

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Ordre : entolomatales

Famille :
entolomataceae
Nom latin :
Entoloma lividum

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Cortinaire violet

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe :
Basidiomycetes

Ordre : agaricales

Famille :
cortinariaceae

Nom latin :
Cortinarius
violaceus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Cortinaire roux olivacé

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Basidiomycetes

Ordre : agaricales

Famille :

cortinariaceae

Nom latin :

Cortinarius rufoolivaceus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Cortinaire à armille écaileuse

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

Milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Basidiomycetes

Ordre : agaricales

Famille :

cortinariaceae

Nom latin :

Cortinarius

pholideus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Clavaire violette

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : clavariales
Famille : clavariaceae
Nom latin : *Clavaria zollingeri*

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Chantrelle jaune et violette

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre :
cantharellales
Famille :
cantharellaceae
Nom latin :
Cantharellus
ianthinoxanthus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Cèpe tête de nègre

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Ordre : boletales

Famille :

boletaceae

Nom latin :

Boletus aereus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Bolet satan

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Ordre : boletales

Famille :

boletaceae

Nom latin :

Boletus satanas

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bolet pomme de pin

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Ordre : boletales

Famille :

boletaceae

Nom latin :

Strobilomyces
strobilaceus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bolet faux-royal

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Ordre : boletales

Famille :

boletaceae

Nom latin :

Boletus

pseudoregius

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bolet de l'aulne

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : boletales

Famille :
paxillaceae
Nom latin :
Gyrodon lividus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bolet châtaigne

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe : /

Ordre : boletales

Famille :

gyroporaceae

Nom latin :

Gyroporus
castaneus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bolet appendiculé

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Ordre : boletales

Famille :

boletaceae

Nom latin :

Boletus
appendiculatus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bolet à pied jaune

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Ordre : boletales

Famille :

boletaceae

Nom latin :

Leccinum

crocipodium

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Amanite étranglée

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : Amanitales

Famille :
amanitaceae

Nom latin :
Amanita ceciliae

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Amanite épineuse

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :

Ordre : Amanitales

Famille :

amanitaceae

Nom latin :

Amanita
echinocephala

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Armoise maritime

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Flore

milieu : Estuaires

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

Equisetopsida

Ordre : asterales

Famille :

asteraceae

Nom latin :

Artemisia maritima

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Rouge-queue à front blanc

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Avifaune

milieu : Bocage

Taxonomi e

Règne : Animalia

Embranchement :

Chordata

Classe : aves

Ordre :

passeriformes

Famille : :

saxicolidae

Nom latin :

Phoenicurus

phoenicurus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Pouillot siffleur

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Avifaune

Milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe : aves

Ordre :
passeriformes

Famille :
sylviidae

Nom latin :
Phylloscopus
sibilatrix

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Pic épeichette

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Avifaune

milieu : Bocage

Taxonomi e

Règne : Animalia

Embranchement :

Chordata

Classe : aves

Ordre : piciformes

Famille : picidae

Nom latin :

Dendrocopos minor

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Moineau friquet

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Avifaune

Milieu : Bocage

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :

Chordata

Classe : aves

Ordre :

passeriformes

Famille :

passeridae

Nom latin : *Passer montanus*

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Caille des blés

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Avifaune

milieu : Openfield

Taxonomi e

Règne : Animalia

Embranchement :

Chordata

Classe : aves

Ordre :

galliformes

Famille :
phasianidae
Nom latin :
Coturnix coturnix

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Busard cendré

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Avifaune

milieu : Openfield

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe : aves

Ordre :
falconiformes

Famille :
accipitridae
Nom latin : *Circus*
pygargus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCM0

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bruant proyer

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Avifaune

milieu : Openfield

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe : aves

Ordre :
passeriformes

Famille :
emberizidae

Nom latin :
Emberiza calandra

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bondrée apivore

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Avifaune

Milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Animalia

Embranchement :

Chordata

Classe : aves

Ordre :

falconiformes

Famille :

accipitridae

Nom latin : *Pernis apivorus*

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Autour des palombes

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Avifaune

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Animalia

Embranchement :

Chordata

Classe : aves

Ordre :

falconiformes

Famille : :

accipitridae

Nom latin :

Accipiter gentilis

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018